



VACUNAS REQUERIDAS PARA EL INGRESO A GUARDERIAS Y EL PREESCOLAR Julio 1, 2012 – Junio 30, 2013

VACUNA	A los 3 Meses (antes of después del último día del segundo mes)	A los 5 Meses (antes o después del último día del cuarto mes)	A los 7 Meses (antes o después del último día del sexto mes)	A los 16 Meses (antes o después del último día del decimo sexto mes)	A los 19 Meses (antes o después del último día del decimo noveno mes)
Hepatitis B	Dosis 1 La primera dosis puede darse al nacer.	Dosis 2 La segunda dosis puede darse en el primer mes.			Dosis 3
Difteria, Tétanos, Tos ferina (DTaP/DT)	Dosis 1	Dosis 2	Dosis 3 Puede recibirse a partir de los 6 meses.		Dosis 4 La dosis numero 4 puede recibirse a partir de los 12 meses, siempre y cuando la dosis 3 y 4 hayan sido separadas por 6 meses.
Haemophilus influenzae tipo B (Hib)	Dosis 1	Dosis 2	Dosis 3	Dosis 4	
Polio (IPV u OPV)	Dosis 1	Dosis 2 Puede recibirse a partir de los 4 meses.			Dosis 3
Neumocócica Conjugada (PCV7 o PCV13)	Dosis 1	Dosis 2	Dosis 3	Dosis 4*	
Sarampión, Paperas y Rubéola	No se da antes de los 12 meses de edad.			Dosis 1	
Varicela	No se da antes de los 12 meses de edad.			Dosis 1 O El proveedor de salud verifica que se padeció la enfermedad.	

*Puede que algunos niños reciban un total de 5 dosis de la vacuna. Una dosis de refuerzo de la vacuna PCV13 es recomendable, pero no requerida, para todos los niños de los 14 a 59 meses de edad que hayan recibido 4 dosis de PCV7.

- Para información sobre los requisitos de entrada al kínder, consulte el esquema en *Vacunas requeridas para el ingreso escolar, grados k-12*.
- Niño de edad escolar (grados k-12) en programas extraescolares de turno matutino y vespertino deben cumplir con los requisitos de vacunación de su grado escolar.
- Encuentre información sobre otras vacunas recomendadas pero no requeridas para asistir a guarderías y el preescolar en: www.immunize.org/cdc/schedules/

Edad e intervalos mínimos para dosis de vacunas validas

Vacuna	Núm. de dosis	Edad mínima	Intervalo mínimo entre dosis	Notas
Hepatitis B (HepB)	Dosis 1	Nacimiento	4 semanas entre dosis 1 y 2	<ul style="list-style-type: none"> La dosis final de la serie debe darse a partir de las 24 semanas de edad.
	Dosis 2	4 semanas	8 semanas entre dosis 2 y 3	
	Dosis 3	24 semanas	16 semanas entre dosis 1 y 3	
Difteria, Tétanos y Tos ferina (DTaP/DT)	Dosis 1	6 semanas	4 semanas entre dosis 1 y 2	<ul style="list-style-type: none"> Calendario de vacunas típico: 2, 4, 6 y de 15 a 18 meses de edad. Se recomienda un espacio de 6 meses entre dosis 3 y 4, pero un espacio de 4 meses o más es aceptable.
	Dosis 2	10 semanas	4 semanas entre dosis 2 y 3	
	Dosis 3	14 semanas	6 meses entre dosis 3 y 4	
	Dosis 4	12 meses	6 meses entre dosis 4 y 5	
	Dosis 5	4 años	–	
<i>Haemophilus influenzae</i> tipo B (Hib)	Dosis 1	6 semanas	4 semanas entre dosis 1 y 2	<ul style="list-style-type: none"> Si la dosis 2 se dio antes de los 12 meses de edad y la dosis 3 a partir de los 12 meses, se requerirá un total de 3 dosis para estar al día. Si la dosis 1 se dio antes de los 12 meses de edad y la dosis 2 se dio a partir de los 12 meses, se requerirá un total de dos dosis para estar al día. Se requiere solo una dosis si se da a partir de los 15 meses de edad. Solo se requiere un total de 3 dosis, si se dan todas las 3 dosis de PedvaxHIB.
	Dosis 2	10 semanas	4 semanas entre dosis 2 y 3	
	Dosis 3	14 semanas	8 semanas entre dosis 3 y 4	
	Dosis 4	12 meses	–	
Neumocócica Conjugada (PCV7 o PCV13)	Dosis 1	6 semanas	4 semanas entre dosis 1 y 2	<ul style="list-style-type: none"> Se requieren un total de tres dosis para estar al día únicamente si la dosis 2 se dio antes de los 12 meses y la dosis 3 a partir de los 12 meses de edad. Se requieren dos dosis si ambas fueron recibidas entre los 12 y 24 meses de edad y por lo menos 8 semanas aparte. Se requiere una dosis si esta fue recibida a partir de los 24 meses. Se recomienda solo una dosis de refuerzo de la vacuna PCV13 para todos los niños de 14 a 59 meses de edad que hayan recibido 4 dosis de PCV7.
	Dosis 2	10 semanas	4 semanas entre dosis 2 y 3	
	Dosis 3	14 semanas	8 semanas entre dosis 3 y 4	
	Dosis 4	12 meses	–	
Polio (IPV u OPV)	Dosis 1	6 semanas	4 semanas entre dosis 1 y 2	<ul style="list-style-type: none"> Se aceptan tres dosis de la vacuna si el niño recibió la dosis 3 a partir de los 4 años de edad.
	Dosis 2	10 semanas	4 semanas entre dosis 2 y 3	
	Dosis 3	14 semanas	6 meses entre dosis 3 y 4	
	Dosis 4	4 años	–	
Sarampión, Paperas y Rubéola (MMR o MMRV)	Dosis 1	12 meses	4 semanas entre dosis 1 y 2	<ul style="list-style-type: none"> La vacuna MMRV (MMR + varicela) puede utilizarse en lugar de las vacunas MMR y varicela por separado. NO aplica el periodo de gracia de 4 días entre dosis de vacunas virales atenuadas del mismo tipo, como MMR/MMR o MMRV/MMRV. NO aplica el periodo de gracia de 4 días entre la dosis 1 y la 2 de vacunas virales atenuadas de diferentes tipos, como entre MMR y Varicela o MMR e influenza atenuada.
	Dosis 2	13 meses	–	
Varicela (VAR)	Dosis 1	12 meses	3 meses entre dosis 1 y 2	<ul style="list-style-type: none"> Se recomienda un espacio de 3 meses entre dosis de varicela, pero un promedio mínimo de 28 días es aceptable. Tiene que recibirse el mismo día que la vacuna MMR o por lo menos 28 días aparte (NO aplica el periodo de gracia de 4 días).
	Dosis 2	15 meses	–	

Si usted tiene una discapacidad y necesita este documento en otro formato, por favor llame al 1-800-525-0127 (1-800-833-6388 relevador TTY).